

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP 14-5-71 185460

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

EDITION DE LA STATION "ALSACE ET LORRAINE"

(BAS-RHIN, HAUT-RHIN, MEURTHE-ET-MOSELLE, MEUSE, MOSELLE, VOSGES)

Cité Administrative — 67 - STRASBOURG

Tél. 34-14-63 - Poste 93

ABONNEMENT ANNUEL 25 F

C. C. P. STRASBOURG 55-08-00 F

Régisseur de recettes D.D.A.

2, Rue des Mineurs

67 - STRASBOURG

Supplément n° 1 au Bulletin n° 128 du mois de Mai 1971

12 Mai 1971

GRANDES CULTURES

BETTERAVES INDUSTRIELLES

PUCERONS NOIRS

De très nombreuses colonies de Pucerons noirs sont en voie d'installation dans la majorité des cultures de betteraves sucrières. Elles sont particulièrement fortes dans l'ACKERLAND - KOCHERSBERG (67).

La végétation des betteraves étant très lente par suite de la sécheresse, les Pucerons vont commettre de très sérieux dégâts, d'autant plus que ces derniers trouvent toutes les conditions requises pour évoluer rapidement.

PEGOMYIE

Nous rappelons que l'importance des pontes de Pégomyie doit nous inciter à la plus grande prudence. Nous relevons, dans plusieurs parcelles, plus de 12 pontes par feuille.

! Par suite des conditions atmosphériques actuelles, ces !
! deux ravageurs risquent de compromettre fortement l'avenir des !
! cultures de betteraves sucrières. En conséquence, un traitement !
! insecticide très soigné devra être exécuté dès réception, en pre- !
! nant la précaution d'utiliser un produit efficace à la fois sur !
! Pégomyie et sur Pucerons. (Consulter la liste des produits en votre !
! possession). !

HOUBLON

MILDIOU

Nous constatons que trop de houblonniers gardent l'habitude de traiter systématiquement les houblonnières contre le Mildiou, à une cadence allant de huit à dix jours.

Nous précisons qu'actuellement, les risques de contaminations sont limités. Malgré le passage orageux, la pluviométrie devrait rester déficitaire. Cependant, la poussée végétative des houblons étant très rapide, un deuxième traitement fongicide est recommandé.

ARBRES FRUITIERS - PETITS FRUITS

PUCERONS

Une très forte activité des Pucerons est notée sur l'ensemble des espèces fruitières, sur petits fruits, ainsi que sur diverses plantes ornementales. Intervenir après reconnaissance des Pucerons dans les cultures.

La lutte contre les Pucerons doit être menée avec beaucoup de soins dans les pépinières.

VIGNE

TORDEUSES DE LA GRAPPE (Cochylis - Eudémis)

Les premiers vols de Cochylis et d'Eudémis ont débuté depuis quelques jours. Le nombre des captures de Cochylis en pots-pièges est très élevé.

Il semble que le maximum de ce premier vol soit atteint, aussi bien en élevage que dans nos postes de capture, dans les expositions les plus avancées.

Il est, cependant, trop tôt pour intervenir à l'aide de produits de type curatif. Attendre un nouvel avis de la Station.

Les viticulteurs ayant l'habitude de traiter préventivement (avant l'éclosion des oeufs) pourront envisager le traitement entre le 15 et le 18 Mai.

Les Contrôleurs chargés des
Avertissements Agricoles :
C. GACHON et Ch. JANUS.

L'Inspecteur de la
Protection des Végétaux :
J. HARRANGER.

Dernière Note parue : Bulletin n° 128 du mois de Mai publié en date du 7 Mai 1971.

12 Mai 1971

V I G N E

CONCOURS POUR LA DETECTION DES PREMIERES TACHES DE MILDIOU

Le dépistage des premières taches de Mildiou de la vigne présente un intérêt certain. C'est la raison pour laquelle la Station d'Avertissements Agricoles organise cette année encore, un concours pour la détection des foyers primaires de Mildiou.

Il sera procédé à la répartition des prix suivants :

- Pour chacun des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin :
 - 1 prix d'une valeur de 50.- F.
 - 2 prix d'une valeur de 30.- F.
- Pour chacun des départements de la Moselle et de la Meurthe-et-Moselle :
 - 1 prix d'une valeur de 50.- F.
 - 1 prix d'une valeur de 30.- F.

L'envoi aura le maximum de chances d'arriver en parfait état si les feuilles sont enveloppées dans de la mousse ou du coton hydrophile légèrement humide et emballées dans un sachet en matière plastique.

Afin d'obtenir le maximum de précisions sur l'implantation de ces premiers foyers, nous vous proposons d'utiliser la fiche de renseignements ci-dessous.

(à détacher)

Nom et Prénoms :

Adresse :

Commune :

Lieu-dit :

Cépages :

Situation de la feuille malade sur la souche :
(1ère, 2ème, 3ème, 4ème feuille, etc...)

Nombre de taches observées dans la parcelle :

Situation de la parcelle : coteau - plaine :

Date de la découverte :

Signature :

128